

LEO®

**LISEZ LE PRÉSENT DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS SUR LES MÉDICAMENTS**

FUCIDIN®

**Acide fusidique, crème à 2 %
Fusidate de sodium, onguent à 2 %**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à appliquer **FUCIDIN®** et à chaque renouvellement d'ordonnance. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tous les renseignements au sujet du médicament. Parlez de votre problème de santé et de votre traitement médical à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **FUCIDIN®**.

À quoi sert FUCIDIN®?

FUCIDIN® sert à traiter des infections cutanées lorsque la peau est infectée par des germes (bactéries), dont voici des exemples :

- Impétigo (une plaque de peau suintante, croûteuse et enflée)
- Érythrasma (des plaques de peau brunes qui pèlent, qu'on observe habituellement dans les plis de peau, notamment sous les aisselles ou les seins)
- Coupures et brûlures infectées

Les agents antibactériens comme la crème et l'onguent FUCIDIN traitent les infections bactériennes seulement. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales. Bien que vous puissiez vous sentir mieux dès les premiers jours de votre traitement, il est important de continuer à prendre la crème ou l'onguent FUCIDIN en suivant les instructions à la lettre. L'utilisation abusive ou inappropriée de la crème et de l'onguent FUCIDIN peut favoriser la croissance de bactéries qui ne seront pas éliminées par la crème et l'onguent FUCIDIN (résistance), ce qui signifie que la crème et l'onguent FUCIDIN pourraient ne pas fonctionner pour vous lors d'une utilisation ultérieure. Ne partagez jamais vos médicaments avec qui que ce soit.

Comment FUCIDIN® agit-il?

La crème FUCIDIN® contient de l'acide fusidique. L'onguent FUCIDIN® contient du fusidate de sodium. Ces deux médicaments sont des antibiotiques utilisés pour détruire les bactéries causant des infections.

Quels sont les ingrédients de FUCIDIN®?

Ingrédients médicinaux :	La crème FUCIDIN® contient de l'acide fusidique à 2 % (hémihydrate)
Ingrédients non médicinaux :	L'onguent FUCIDIN® contient du fusidate de sodium à 2 % Crème FUCIDIN® – rac- α -tocophérol total, butylhydroxyanisole (E320), alcool cétylique, glycérol (85 %), acide chlorhydrique, paraffine blanche molle, paraffine liquide, polysorbate 60, sorbate de potassium, eau purifiée. Onguent FUCIDIN® – rac- α -tocophérol total, butylhydroxytoluène (E321), alcool cétylique, paraffine

LEO®

blanche molle, paraffine liquide, graisse de laine (lanoline).

FUCIDIN® est offert dans les formes posologiques qui suivent :

La crème FUCIDIN® est de couleur blanche ou blanchâtre.

L'onguent FUCIDIN® est translucide et de couleur jaunâtre à blanche.

N'utilisez pas FUCIDIN® si :

- Vous êtes allergique à l'un des ingrédients de la crème ou de l'onguent FUCIDIN®, ou à l'un des composants du contenant.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'appliquer FUCIDIN®, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables liés à celle-ci ainsi que d'en assurer la bonne utilisation. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :

- vous êtes enceinte ou vous devenez enceinte durant le traitement par FUCIDIN®;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter.

Autres mises en garde à connaître :

- N'utilisez pas la crème ou l'onguent Fucidin® pendant plus de 14 jours.
- L'utilisation de la crème ou de l'onguent Fucidin® pendant plus de 14 jours peut favoriser la croissance de bactéries qui ne seront pas éliminées (résistance).
- La crème Fucidin® contient du butylhydroxyanisole, de l'alcool cétylique et du sorbate de potassium, des ingrédients non médicinaux. Ces ingrédients peuvent causer sur la peau une éruption rouge et accompagnée de démangeaisons (dermatite de contact), à l'endroit où la crème Fucidin® est appliquée. Le butylhydroxyanisole peut aussi provoquer une irritation des yeux et des muqueuses (des lèvres ou de la région anale).
- L'onguent Fucidin® contient de l'alcool cétylique, de la lanoline hydratée et du butylhydroxytoluène (E321), des ingrédients non médicinaux. Ces ingrédients peuvent causer sur la peau une éruption rouge et accompagnée de démangeaisons (dermatite de contact), à l'endroit où l'onguent Fucidin® est appliqué. Le butylhydroxytoluène (E321) peut aussi provoquer une irritation des yeux et des muqueuses (des lèvres ou de la région anale).
- Vous ne devez pas laisser FUCIDIN® entrer en contact avec les yeux. Si la crème ou l'onguent entre en contact avec les yeux, il pourrait en résulter une irritation oculaire.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels, produits de médecine douce, etc.

Interactions possibles avec FUCIDIN® :

L'utilisation de FUCIDIN® en association avec d'autres médicaments n'a pas été étudiée.

Toutefois, puisque les médicaments peuvent interagir entre eux, avertissez votre professionnel de la santé si vous prenez d'autres médicaments pour le traitement des infections cutanées.

Application de FUCIDIN® :

Dose habituelle :

- Sans bandage : appliquer une petite quantité de crème ou d'onguent FUCIDIN® deux à trois fois par jour sur les régions touchées, pendant un maximum de 7 à 14 jours.
- Avec bandage : une ou deux applications quotidiennes peuvent suffire.

LEO®

Dans les cas d'impétigo, il n'est pas nécessaire d'enlever les croûtes avant l'application de FUCIDIN®.

Utiliser Fucidin® exactement comme indiqué. Ne pas l'appliquer en plus ou moins grande quantité, ni plus souvent que recommandé par votre professionnel de la santé.

Surdosage :

En cas de surdosage ou si FUCIDIN® est avalé par accident, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous avez oublié d'appliquer FUCIDIN®, utilisez-le aussitôt que vous vous en rendez compte. Reprenez votre horaire habituel pour la prochaine application.

Quels sont les effets secondaires possibles de FUCIDIN®?

En prenant FUCIDIN®, vous pourriez présenter d'autres effets secondaires que ceux qui figurent sur la liste qui suit. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. Veuillez aussi consulter la sections Mises en garde et précautions.

Voici certains effets secondaires possibles de FUCIDIN® :

- démangeaisons, sensation de brûlure, d'irritation ou de douleur dans la région où le médicament est appliqué
- divers types d'irritation cutanée (dermatite)
- rougeur cutanée
- cloques sur la peau
- urticaire (une réaction de la peau causant des boursouflures qui démangent)

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme/effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
RARES Réactions allergiques (oedème de Quincke) : étourdissement, démangeaisons, éruption cutanée grave, enflure (bouche, gorge, lèvres, mains), difficulté à respirer			✓
Conjonctivite : coloration rose ou rouge du blanc d'un œil ou des yeux, larmoiement, démangeaison ou irritation des yeux, écoulement oculaire, formation de croûtes sur les paupières ou les cils		✓	

LEO®

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire gênant vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Signalement des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation :

CRÈME FUCIDIN : Entreposez à une température inférieure à 30 °C.

ONGUENT FUCIDIN : Entreposez à une température inférieure à 30 °C. Utilisez dans les 3 mois suivant la première ouverture du tube.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants et des animaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur FUCIDIN® :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Vous pouvez lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme les renseignements pour les patients sur les médicaments apparaissant présentés dans ce document, en consultant le [site Web de Santé Canada](https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html) (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); ou le site Web du fabricant <http://www.leo-pharma.ca/fr/Home>, ou encore en téléphonant au 1 800 668-7234.

Le présent dépliant a été rédigé par LEO Pharma Inc.

^{MC} Marque de commerce de LEO Pharma A/S, utilisée sous licence par LEO Pharma Inc., Thornhill, L3T 7W8

Dernière révision : 10 JUILLET 2017