

타크로리무스 성분 제제(국소제형) 허가사항 변경(안)

‘일반적 주의’ 항

1)~6) <생략>

7) 타크로리무스 연고제의 사용은 타크로리무스의 전신 흡수를 증가시킬 가능성이 있는 피부장벽 결손이 있는 환자에서는 권장되지 않는다 (예. Netherton's syndrome, 증판상 어린선, 전신성 홍색 피부증, 피부 이식편대숙주질환 또는 [과저 화농 피부증](#)). 또한, 이 약의 경구 적용 역시 권장되지 않는다. 시판후 조사에서 보고된 타크로리무스 혈중 농도 상승 사례는 이러한 조건에서 보고된 것이다.

8)~9) <생략>

타크로리무스 성분 제제(국소제형) 허가사항 변경대비표

항목	기허가 사항	변경(안)
<p>일반적 주의</p>	<p>1)~6) <생략> 7) 타크로리무스 연고제의 사용은 타크로리무스의 전신 흡수를 증가시킬 가능성이 있는 피부장벽 결손이 있는 환자에서는 권장되지 않는다 (예. Netherton's syndrome, 증판상 어린선, 전신성 홍색피부증 또는 피부 이식편대숙주질환 <신설>). 또한, 이 약의 경구 적용 역시 권장되지 않는다. 시판후 조사에서 보고된 타크로리무스 혈중 농도 상승 사례는 이러한 조건에서 보고된 것이다. 8)~9) <생략></p>	<p>1)~6) <생략> 7) 타크로리무스 연고제의 사용은 타크로리무스의 전신 흡수를 증가시킬 가능성이 있는 피부장벽 결손이 있는 환자에서는 권장되지 않는다 (예. Netherton's syndrome, 증판상 어린선, 전신성 홍색피부증, 피부 이식편대숙주질환 또는 과저 화농 피부증). 또한, 이 약의 경구 적용 역시 권장되지 않는다. 시판후 조사에서 보고된 타크로리무스 혈중 농도 상승 사례는 이러한 조건에서 보고된 것이다. 8)~9) <생략></p>