



> Hoe het antistollingsmiddel injecteren?



- > Kies een inspuitplek op de buik.
- > Verander dagelijks van inspuitplaats.
- > Vermijd de navel.
- > Andere mogelijke inspuitplaatsen: buitenzijde bovenbeen, bovenkant bil.



- > Was uw handen.
- > Open de afsluitdop van de minicontainer om de spuit uit de minicontainer te halen.



- > Buig het oranje veiligheidsklepje weg van de grijze beschermdop op de naald.



- > Ontsmet de inspuitplaats.



- > Verwijder de grijze beschermdop van de naald.

> LET OP:

er zit een luchtbel in de spuit, deze mag niet verwijderd worden als u de totale hoeveelheid in de spuit nodig heeft voor uw dosis.

Houd de spuit enkele seconden met de naald naar beneden gericht zodat de luchtbel boven in de spuit komt te zitten.

(Indien u echter de totale hoeveelheid niet nodig heeft, moet het overtollige volume eerst worden verwijderd om de juiste dosering voor subcutane injectie te bereiken).




- > Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger.
- > Prik de naald volledig en loodrecht in de huidplooi.
- > Houd de huidplooi gedurende de injectie vast.
- > **Injecteer langzaam**, de luchtbel moet mee geïnjecteerd worden.



NIET wrijven over de huid na het inspuiten!

- > Trek de naald helemaal terug terwijl u de huidplooi nog altijd vasthoudt.



- > Buig het oranje veiligheidsklepje terug tot tegen de naald door het tegen een hard oppervlak te duwen.



- > Duw de naald verder door tot ze vastgeklit zit in het oranje veiligheidsklepje.



- > Plaats de gebruikte spuit terug in de mini-container. Sluit de minicontainer door de afsluitdop in te drukken tot u een klik hoort.