

## Gebrauchsinformation

pal-fucidine-crème-address change LR

### GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

#### Fucidine® 20 mg/g Creme

Fusidinsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Fucidine® Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fucidine® Creme beachten?
3. Wie ist Fucidine® Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fucidine® Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### 1. WAS IST FUCIDINE® CREME UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Fucidine® Creme enthält Fusidinsäure und ist ein Steroidantibiotikum, das sich zur lokalen Behandlung von infizierten Hauterkrankungen eignet, die durch Fusidinsäure-empfindliche Bakterien hervorgerufen werden.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FUCIDINE® CREME BEACHTEN?

##### **Fucidine® Creme darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fusidinsäure oder einen der sonstigen Bestandteile von Fucidine® Creme sind.

##### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Fucidine® Creme ist erforderlich:**

- wenn die Creme über einen längeren Zeitraum oder wiederholt angewendet wird, da hierdurch die krankheitserregenden Bakterien unempfindlich gegen das Antibiotikum werden können.
- bei der Behandlung im Genital- oder Analbereich, da es wegen der Hilfsstoffe Paraffin und Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen kann.
- bei der Anwendung in der Nähe der Augen, da dies zu Augenreizungen führen kann.

##### **Bei Anwendung von Fucidine® Creme mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### Schwangerschaft

Fusidinsäure, der Wirkstoff von Fucidine® Creme, wird bei äußerlicher Anwendung nur in sehr geringer Menge vom Körper aufgenommen. Fucidine® Creme darf deshalb während der Schwangerschaft angewendet werden.

#### Stillzeit

Fucidine® Creme darf während der Stillzeit angewendet werden, doch es wird empfohlen, das Präparat nicht auf die Brust aufzutragen.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen ist nicht bekannt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Fucidine® Creme**

Sowohl Cetylalkohol als auch Kaliumsorbat können örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) sowie Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

## **3. WIE IST FUCIDINE® CREME ANZUWENDEN?**

**Wenden Sie Fucidine® Creme immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- Tragen Sie die Fucidine® Creme ein- bis mehrmals täglich dünn auf die geschädigte Haut auf.
- Bei Behandlung ohne Verband tragen Sie die Fucidine® Creme 3-mal täglich auf.
- Bei Anlegen eines Verbandes genügt es, wenn Sie die Fucidine® Creme einmal täglich auftragen.
- Tragen Sie die Creme während der Behandlungsdauer regelmäßig auf und vermeiden Sie ein- oder mehrtägige Pausen.
- Ihr Arzt entscheidet über die Dauer der Anwendung.
- Die Behandlung erfolgt im Allgemeinen bis zum Abheilen der Hauterscheinungen.

Fucidine® Creme ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

**Wenn Sie eine größere Menge von Fucidine® Creme angewendet haben, als Sie sollten,** entfernen Sie die überschüssige Menge Creme mit einem trockenen Tuch, und setzen Sie die nächste Behandlung mit der vorgeschriebenen Menge an Creme fort. Vergiftungserscheinungen durch Überdosierungen sind unwahrscheinlich.

### **Wenn Sie die Anwendung von Fucidine® Creme vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie eine vorherige Anwendung vergessen haben. Bitte setzen Sie die Behandlung mit der vorgeschriebenen Menge Creme fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Fucidine® Creme Nebenwirkungen hervorrufen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Gelegentlich** (1 bis 10 Behandelte von 1.000)

- Entzündung der Haut (Ekzem), Hautausschlag (kann mit Pusteln, Bläschen und Rötung einhergehen), Juckreiz, Hautrötung
- Schmerzen am Verabreichungsort (inkl. Gefühl des Hautbrennens), Reizung am Verabreichungsort

**Selten** (1 bis 10 Behandelte von 10.000)

- Überempfindlichkeitsreaktionen
- Bindehautentzündung
- Angioödem (plötzlich auftretende, schmerzlose Schwellung von Haut und Schleimhaut), Nesselsucht, Blasenbildung

#### Kinder und Jugendliche

Es wird angenommen, dass Häufigkeit, Art und Schweregrad von Nebenwirkungen bei Kindern und Erwachsenen vergleichbar sind.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST FUCIDINE® CREME AUFZUBEWAHREN?

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Karton und der Tube nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich.

#### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Nach Anbruch ist die Creme 4 Wochen haltbar.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### **Was Fucidine® Creme enthält**

Der **Wirkstoff** ist:

1 g Creme enthält 20,3 mg Fusidinsäure 0,5 H<sub>2</sub>O, entsprechend 20,0 mg Fusidinsäure.

Die **sonstigen Bestandteile** sind:

Cetylalkohol (Ph. Eur.)

Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.)

Glycerol 85 %

Kaliumsorbat (Ph. Eur.)

dünnflüssiges Paraffin

Polysorbat 60

All-rac-alpha-Tocopherol  
Salzsäure 10 %  
weißes Vaseline  
gereinigtes Wasser

**Wie Fucidine® Creme aussieht und Inhalt der Packung**

Originalpackungen zu 5 g, 15 g, 30 g und 100 g Creme

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Der pharmazeutische Unternehmer ist:

LEO Pharma A/S  
Industriparken 55  
2750 Ballerup  
Dänemark

Der Hersteller ist:

LEO Laboratories Ltd.  
285 Cashel Road  
Dublin 12  
Irland

oder

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.  
Via E. Schering 21  
20054 Segrate (MI)  
Italien

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung:

LEO Pharma GmbH  
Frankfurter Straße 233, A2  
63263 Neu-Isenburg  
Telefon: 06102-201-0  
Telefax: 06102-201-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2023.

---

**EIGENSCHAFTEN**

Fucidine® Creme ist ein spezifisches Hautantibiotikum und bietet neben den therapeutischen Vorteilen der antibakteriellen Wirksubstanz eine angenehme, einfache und saubere Handhabung. Fucidine® Creme kühlt, zieht rasch ein und verschmutzt die Wäsche nicht.