



# > Hoe het antistollingsmiddel injecteren?



- > Kies een inspuitplek op de buik.
- > Verander dagelijks van inspuitplaats.
- > Vermijd de navel.
- > Andere mogelijke inspuitplaatsen: buitenzijde bovenbeen, bovenkant bil.




- > Was uw handen.
- > Open de afsluitdop van de minicontainer om de spuit uit de minicontainer te halen.



- > Buig het oranje veiligheidsklepje weg van de grijze beschermdop op de naald.



- > Ontsmet de inspuitplaats.



- > Verwijder de grijze beschermdop van de naald.

## > LET OP:

- > De luchtbel hoort in de spuit! Deze dient u NIET te verwijderen. Indien de luchtbel niet goed geplaatst is, tik dan zachtjes tegen de spuit of houd de spuit enkele seconden met de naald naar beneden gericht, zodat de luchtbel zich naar het bovenste gedeelte van de spuit verplaatst.
- > Indien u de totale hoeveelheid oplossing niet nodig heeft, vermindert u eerst de hoeveelheid vloeistof in de spuit tot aan de dosis voorgeschreven door uw arts.




- > Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger.
- > Prik de naald volledig en loodrecht in de huidplooi.
- > Houd de huidplooi gedurende de injectie vast.
- > **Injecteer langzaam**, de luchtbel moet mee geïnjecteerd worden.



**NIET** wrijven over de huid na het inspuiten!

- > Trek de naald helemaal terug terwijl u de huidplooi nog altijd vasthoudt.



- > Buig het oranje veiligheidsklepje terug tot tegen de naald door het tegen een hard oppervlak te duwen.



- > Duw de naald verder door tot ze vastgeklit zit in het oranje veiligheidsklepje.



- > Plaats de gebruikte spuit terug in de minicontainer. Sluit de minicontainer door de afsluitdop in te drukken tot u een klik hoort.