


¿LE CUESTA MUCHO
CONTROLAR SU ECCEMA
CRÓNICO DE MANO?

**ES HORA
DE USAR**

 **Anzupgo®**
(delgocitinib) cream 2%



Retratos de actores.



El **primer y único** tratamiento **aprobado por la FDA** para adultos con **eccema crónico de mano (CHE)** de moderado a grave

INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es ANZUPGO?

ANZUPGO es un medicamento de venta con receta que se usa en la piel (uso tópico) para tratar el eccema crónico de manos (Chronic Hand Eczema, CHE) de moderado a grave en adultos que no están bien controlados con corticosteroides tópicos o que no pueden usarlos.

No se recomienda el uso de ANZUPGO junto con otros inhibidores de JAK o inmunosupresores potentes.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.

IR MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE



Retrato de actor.



COMPRENDER EL CHE

El eccema crónico de mano (CHE) es una **afección inflamatoria** distinta que puede ser impredecible. Los síntomas incluyen picazón, dolor y más, pero **el CHE puede verse de diferentes maneras en distintas personas**. Esto es lo que debe saber:

1

El CHE se diagnostica cuando el eccema de mano:



Aparece en cualquier parte de las **manos y muñecas**



Dura más de **3 meses**



Reaparece **2 o más veces al año**

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.

2

La exposición a ciertos alérgenos y sustancias puede aumentar el riesgo de padecer CHE. Su riesgo también puede ser mayor si se le ha diagnosticado eccema (dermatitis atópica) en otras partes del cuerpo.

LOS DESENCADENANTES PUEDEN INCLUIR:



Jabones



Metales



Exposición ocupacional



Lavado de manos con frecuencia

3

A menudo se recetan corticosteroides tópicos, pero tienen limitaciones.

Retrato de actor.




ELIJA EL ÚNICO TRATAMIENTO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA TRATAR EL CHE:

una crema para manos sin corticosteroides que **actúa en la piel bloqueando las proteínas de señalización clave que desencadenan el CHE.**





Anzupgo[®]
(delgocitinib) cream 2%



Retratos de actores.

ES HORA DE USAR — ANZUPGO —



Retratos de actores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

ANZUPGO es para uso en la piel (uso tópico) solamente. No use ANZUPGO en los ojos, la boca o la vagina.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ANZUPGO?

ANZUPGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Infecciones serias: ANZUPGO puede aumentar el riesgo de infecciones. ANZUPGO contiene delgocitinib. El delgocitinib pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores de la cinasa Jano (JAK). Los inhibidores de JAK son medicamentos que afectan el sistema inmunitario. Pueden disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones. Algunas personas han tenido infecciones graves mientras tomaban inhibidores de JAK por boca o aplicados en la piel, incluida la tuberculosis (TB), e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo. Algunas personas han sido hospitalizadas o han muerto a causa de estas infecciones.

EL PRIMER Y ÚNICO TRATAMIENTO
APROBADO POR LA FDA PARA EL ECCEMA
CRÓNICO DE MANO (CHE)

HECHO PARA SUS MANOS

- Crema para manos recetada no grasa, sin corticosteroides
- Piel más depurada y alivio de la picazón y el dolor
- Diseñado para ser fácil de usar, dos veces al día



Retrato de actor.

»» ANZUPGO SE REALIZÓ PENSANDO EN USTED:

Adultos para quienes los corticosteroides tópicos no son la respuesta.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.

ELIJA UNA PIEL SIGNIFICATIVAMENTE MÁS DEPURADA

El CHE puede verse diferente en cada persona.
Visite [ANZUPGO.com](https://www.anzupgo.com) para ver más fotos.



ANTES
Inicio



DESPUÉS
4 meses

ANZUPGO ayudó a muchos participantes del estudio a tener la piel más depurada.
Los resultados individuales pueden variar.

A LOS 4 MESES:

**HASTA
4 VECES
MÁS PERSONAS
VIERON UNA PIEL CLARA
O CASI CLARA**



ANZUPGO en comparación con crema no medicinal

- Estudio 1: **20 %** frente a 10 %
- Estudio 2: **29 %** frente al 7 %

**PIEL SIGNIFICA-
TIVAMENTE
MÁS DEPURADA
en apenas)))
4 SEMANAS**

ANZUPGO en comparación
con crema no medicinal

- Estudio 1: **15 %** frente al 5 %
- Estudio 2: **15 %** frente al 8 %

En el estudio 1: 325 personas usaron ANZUPGO
y 162 personas usaron la crema no medicinal. En
el estudio 2: 313 personas usaron ANZUPGO y
159 personas usaron la crema no medicinal.



[Mi CHE] mejoró notablemente.

– Participante en el estudio clínico de ANZUPGO



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

**¿Cuál es la información más importante que
debo conocer sobre ANZUPGO? (cont.)**

- ANZUPGO no debe ser utilizado por personas con una infección activa y grave. No debe comenzar a usar ANZUPGO si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que está bien. Es posible que tenga un mayor riesgo de desarrollar culebrilla (herpes zóster) o eccema herpético (erupción cutánea ampollosa y dolorosa) durante el tratamiento con ANZUPGO.

Consulte la Información
importante de seguridad
adicional en todo el
documento y la Información de
prescripción completa y la Guía
del medicamento adjuntas.


Anzupgo®
(delgocitinib) cream 2%



ELIJA EL ALIVIO DE LA PICAZÓN Y EL DOLOR

SOLO ANZUPGO ESTÁ APROBADO POR LA FDA
PARA AYUDAR CON EL ECCEMA CRÓNICO DE
MANO (CHE)



No rascarme la piel fue
realmente bueno... no
siento tanto dolor.

- Participante en el estudio
clínico de ANZUPGO



Retratos de actores.



EN LOS ESTUDIOS, ANZUPGO SIN CORTICOSTEROIDES FUE BIEN TOLERADO

Los efectos secundarios más frecuentes
de ANZUPGO incluyen los siguientes:

- reacciones en el lugar de aplicación, incluidos dolor, hormigueo, picazón y enrojecimiento
- infecciones bacterianas de la piel, incluidas celulitis en los dedos e infecciones ungueales
- recuento bajo de glóbulos blancos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ANZUPGO.



Para obtener más información, visite
[ANZUPGO.com](https://anzupgo.com) y hable con su médico.

Consulte la Información
importante de seguridad
adicional en todo el
documento y la Información de
prescripción completa y la Guía
del medicamento adjuntas.


Anzupgo[®]
(delgocitinib) cream 2%

A LOS 4 MESES:

MÁS DEL

DOBLE

DE LAS PERSONAS

**TUVIERON UN ALIVIO
SIGNIFICATIVO DE LA PICAZÓN**



ANZUPGO en comparación con crema no medicinal

Estudio 1: **47 %** frente al 23 %

Estudio 2: **47 %** frente al 20 %

En el estudio 1: 323 personas usaron ANZUPGO y 161 personas usaron la crema no medicinal. En el estudio 2: 309 personas usaron ANZUPGO y 156 personas usaron la crema no medicinal.

HASTA EL

DOBLE

MÁS PERSONAS

**TUVIERON UN ALIVIO
SIGNIFICATIVO DEL DOLOR**



ANZUPGO en comparación con crema no medicinal

Estudio 1: **49 %** frente al 28 %

Estudio 2: **49 %** frente al 23 %

En el estudio 1: 291 personas usaron ANZUPGO y 149 personas usaron la crema no medicinal. En el estudio 2: 294 personas usaron ANZUPGO y 141 personas usaron la crema no medicinal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuál es la información más importante que
debo conocer sobre ANZUPGO? (cont.)

Antes de comenzar con ANZUPGO, informe a su
proveedor de atención médica si:

- está recibiendo tratamiento por una infección o tiene una infección que no desaparece o que sigue reapareciendo
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien con TB

3 PASOS PARA SENTIR ALIVIO

»» Abrir. Esparcir. Disfrutar.



Retrato de actor.

PASO 1

Abra la tapa de acceso fácil y apriete suavemente para colocar una pequeña cantidad de ANZUPGO en las manos secas y limpias.



Retrato de actor.

PASO 2

Esparza una capa delgada solo en las áreas afectadas de las manos y muñecas. Un poco de ANZUPGO, ¡ayuda muchísimo!

No use más de 30 gramos en 2 semanas o 60 gramos en un mes.



Retratos de actores.

PASO 3

¡**DISFRUTE** su día!

¡**ESO ES TODO!**

Consulte a su médico si tiene alguna pregunta sobre ANZUPGO y cómo usarlo de manera segura.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ANZUPGO? (cont.)

Antes de comenzar con ANZUPGO, informe a su proveedor de atención médica si: (cont.)

- ha tenido culebrilla (herpes zóster)
- ha tenido hepatitis B o C



ANZUPGO SE USA DOS VECES AL DÍA



Retrato de actor.



MÁS INFORMACIÓN

- ANZUPGO se usa en la piel de las manos y muñecas únicamente. No use ANZUPGO en los ojos, la boca, la vagina ni en otras membranas mucosas. Si el producto entra en contacto con las membranas mucosas, enjuagar bien con agua
- Use ANZUPGO exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica
- Antes de aplicar ANZUPGO, la piel de las áreas afectadas debe estar limpia y seca
- Si otra persona le aplica ANZUPGO, debe lavarse las manos después de manipular ANZUPGO
- Evite aplicarse vacunas con virus vivos durante el tratamiento con ANZUPGO inmediatamente antes y después

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.


Anzupgo[®]
(delgocitinib) cream 2%




UNA MANO QUE AYUDA PARA SEGUIR ADELANTE

NOS COMPROMETEMOS A BRINDARLE AYUDA DURANTE SU RECORRIDO CON ECCEMA CRÓNICO DE MANOS (CHE)



Retrato de actor



PROGRAMAS DE ACCESO Y AHORROS DE ANZUPGO

Descubra:

- El ahorro de costos a través de nuestro programa de copagos
- El acceso a servicios que pueden ayudar a lo largo del camino



Para obtener más detalles sobre los ahorros y el apoyo de ANZUPGO, visite ANZUPGO.com/savingsandsupport

Anzupgo®
VOICES™

STORIES THAT INSPIRE



INSCRÍBASE

**¿LE RESULTÓ ANZUPGO?
¡QUEREMOS SABER DE USTED!**

ANZUPGO® Voices™ es un programa de embajadores en el que usted y otras personas de la comunidad de ANZUPGO pueden ayudar a quienes están considerando el tratamiento. Al compartir su historia, usted puede ofrecer perspectivas de su propio recorrido personal y ayudar a otros a tomar el control de su eccema crónico de manos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ANZUPGO? (cont.)

Antes de comenzar con ANZUPGO, informe a su proveedor de atención médica si: (cont.)

- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección como fiebre, sudoración o escalofríos; dolores musculares; tos o falta de aire; flema con sangre; pérdida de peso; piel o llagas calientes, rojas o dolorosas en el cuerpo; diarrea o dolor estomacal; ardor al orinar u orinar con más frecuencia de la habitual; y/o se siente muy cansado

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.


Anzupgo®
(delgocitinib) cream 2%

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ANZUPGO es para uso en la piel (uso tópico) solamente. No use ANZUPGO en los ojos, la boca o la vagina.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ANZUPGO?

ANZUPGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Infecciones serias: ANZUPGO puede aumentar el riesgo de infecciones. ANZUPGO contiene delgocitinib. El delgocitinib pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores de la cinasa Jano (JAK). Los inhibidores de JAK son medicamentos que afectan el sistema inmunitario. Pueden disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones. Algunas personas han tenido infecciones graves mientras tomaban inhibidores de JAK por boca o aplicados en la piel, incluida la tuberculosis (TB), e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo. Algunas personas han sido hospitalizadas o han muerto a causa de estas infecciones.

- ANZUPGO no debe ser utilizado por personas con una infección activa y grave. No debe comenzar a usar ANZUPGO si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que está bien. Es posible que tenga un mayor riesgo de desarrollar culebrilla (herpes zóster) o eccema herpético (erupción cutánea ampollosa y dolorosa) durante el tratamiento con ANZUPGO.

Antes de comenzar con ANZUPGO, informe a su proveedor de atención médica si:

- está recibiendo tratamiento por una infección o tiene una infección que no desaparece o que sigue reapareciendo
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien con TB
- ha tenido culebrilla (herpes zóster)
- ha tenido hepatitis B o C
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección como fiebre, sudoración o escalofríos; dolores musculares; tos o falta de aire; flema con sangre; pérdida de peso; piel o llagas calientes, rojas o dolorosas en el cuerpo; diarrea o dolor estomacal; ardor al orinar u orinar con más frecuencia de la habitual; y/o se siente muy cansado

Después de comenzar ANZUPGO, llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de infección. ANZUPGO puede hacer que tenga más probabilidades de contraer infecciones o empeorar cualquier infección que tenga. Si contrae una infección grave, su proveedor de atención médica puede interrumpir su tratamiento con ANZUPGO hasta que su infección esté controlada.

Cáncer de piel no melanoma. ANZUPGO puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer de piel no melanoma. Su proveedor de atención médica le controlará la piel regularmente durante el tratamiento con ANZUPGO.

- Evite las lámparas de sol y limite la cantidad de tiempo que se expone a la luz solar. Use ropa de protección cuando esté al sol y use un protector solar de amplio espectro
- Informe a su proveedor de atención médica si alguna vez ha tenido algún tipo de cáncer.

Posibles riesgos de la inhibición de la cinasa Jano (JAK). Se desconoce si el uso de ANZUPGO tiene los mismos riesgos que tomar inhibidores orales o usar otros inhibidores tópicos de la JAK. Se ha producido un mayor riesgo de muerte (todas las causas) en personas de 50 años de edad o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) que estaban tomando un inhibidor de JAK utilizado para tratar la artritis reumatoide (AR) en comparación con las personas que tomaban otro medicamento en una clase de medicamentos denominados bloqueadores del TNF. ANZUPGO no se debe usar en personas con AR. Los inhibidores orales u otros inhibidores tópicos de JAK también han causado aumento del colesterol.

Antes de usar ANZUPGO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene una infección
- ha recibido recientemente o tiene programado recibir una vacuna. Las personas que usan ANZUPGO no deben aplicarse vacunas con virus vivos durante el tratamiento con ANZUPGO e inmediatamente antes y después del tratamiento
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si ANZUPGO puede dañar a un bebé en gestación
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ANZUPGO pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con ANZUPGO. Si usa ANZUPGO durante la lactancia, evite tocar el pezón y el área circundante inmediatamente después de aplicar ANZUPGO en las manos y muñecas

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de ANZUPGO?

- reacciones en el lugar de la aplicación, que incluyen dolor, hormigueo, picazón y enrojecimiento; infecciones bacterianas de la piel, que incluyen celulitis en los dedos e infecciones ungueales; y recuento bajo de glóbulos blancos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ANZUPGO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.


Anzupgo®
(delgocitinib) cream 2%

ANZUPGO es el **primer y único** tratamiento **aprobado por la FDA** para adultos con **eccema crónico de manos (CHE) de moderado a grave**

DATOS

- ✓ **SIN corticosteroides**, SIN fragancias y SIN parabenos todo en una crema recetada no grasa para manos
- ✓ **Piel depurada y alivio** de la picazón y el dolor
- ✓ Diseñado para ser **fácil de usar**, dos veces al día

Retratos de actores.



¡Reciba apoyo durante su recorrido con el CHE! Regístrese para recibir correos electrónicos en ANZUPGO.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ANZUPGO? (cont.)

Después de comenzar ANZUPGO, llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de infección. ANZUPGO puede hacer que tenga más probabilidades de contraer infecciones o empeorar cualquier infección que tenga. Si contrae una infección grave, su proveedor de atención médica puede interrumpir su tratamiento con ANZUPGO hasta que su infección esté controlada.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.



Anzupgo[®]
(delgocitinib) cream 2%

SÍGANOS



El logotipo de LEO Pharma y ANZUPGO[®] son marcas comerciales registradas de LEO Pharma A/S. Voices[™] es una marca comercial de LEO Pharma A/S. © 2025 LEO Pharma Inc. Todos los derechos reservados. MAT-81195 septiembre de 2025

¡ADELANTE!

HAGA UN SEGUIMIENTO DE SU ÉXITO

En el tratamiento del eccema crónico de manos de moderado a grave, **¡la consistencia es clave!** Mantener el rumbo puede permitirle obtener los resultados que desea.



Anzupgo[®]
(delgocitinib) cream 2%

Marque cuando se aplique ANZUPGO, por la mañana y por la noche, con un bolígrafo borrable para pizarra.



a. m.



p. m.

DOM



LUN



MAR



MIÉ



JUE



VIE



SÁB



RECUERDE: Al final de la semana, **tómese una fotografía de progreso** de sus manos, de modo que pueda ver sus resultados a lo largo del camino. Luego, borre el registro y vuelva a registrar su seguimiento la próxima semana.

Consulte la Indicación y la Información importante de seguridad en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.


Anzupgo®
(delgocitinib) cream 2%



Retrato de actor.

VEA LOS CONSEJOS PARA SEGUIRLOS

1



Siga adelante sabiendo qué esperar

Analice su plan de tratamiento con su proveedor de atención médica para saber qué esperar y cuándo podría ver resultados. Tome notas a lo largo del camino para registrar su experiencia. Úselas para tener un mejor diálogo con su proveedor de atención médica sobre su tratamiento.

2



Adelante, establezca un cronograma

ANZUPGO debe aplicarse **dos veces al día** solo en las áreas afectadas de las manos y muñecas. Hágalo a la misma hora todos los días, por ejemplo, junto con otras actividades diarias. Esto puede ayudar a que la aplicación de ANZUPGO sea parte de su rutina.

3



Es hora de usar ANZUPGO

A veces, es imposible evitar aquello que deriva en síntomas crónicos de eccema de mano porque simplemente es parte de su vida. **Siga con su tratamiento durante el tiempo que necesite, según las indicaciones de su proveedor de atención médica. Asegúrese de hacerle cualquier pregunta que pueda tener sobre su tratamiento con ANZUPGO.**

Consulte la Indicación y la Información importante de seguridad en todo el documento y la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento adjuntas.